



# Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF?

Najważniejsze są najbliższe miesiące: maj-sierpień!  
W tym czasie trzeba podjąć intensywne działania i skupić się  
na najważniejszych zagrożeniach.

**Jak to zrobić?**



*Polskie Mięso*



### **1. Trzymaj dziki na dystans.**

Ogrodzenie fermy musi być pełne na całej długości, bramy muszą być zamykane.

### **Kontroluj teren wokół fermy minimum 1x na 2 tygodnie.**

Jeśli stwierdzisz ślady bytowania dzików w jej sąsiedztwie, dodatkowo zabezpiecz ten obszar poprzez montaż ogrodzenia elektrycznego. Zastosuj preparaty odstrasżające dziki i sznury hukowe.

Sznury hukowe, preparaty odstrasżające stosuj przez kilka dni z rzędu, potem kilka dni przerwy, stosuj je naprzemiennie, aby zwierzęta zbyt szybko nie przyzwyczyły się do nich.

### **2. Zabezpiecz fermę siatkami przeciwko ptakom.**

Można do tego celu wykorzystać tanią siatkę podtynkową.

### **3. Zabezpiecz przed ptakami miejsca składowania padliny.**

Utrzymuj je w stałej czystości, dezynfekuj jak najczęściej.

Stosuj w tych miejscach preparaty przeciwko owadom latającym.

Ustal miejsce/kontener do przechowywania padłych zwierząt tak, aby było jak najdalej od budynków ze świniami.

**4. Utrzymuj w czystości teren wokół fermy (rampy, okolice silosów, podjazdy, miejsca składowania padliny, pomieszczenia socjalne) i sprzęt rolniczy wjeżdżający na teren fermy.**

**Minimum 1x na 2 tygodnie wykonuj sprzątanie i dezynfekcję miejsc wokół fermy i sprzętu rolniczego.**

**5. Kontroluj czystość pojazdów wjeżdżających na teren fermy, a po każdej wizycie auta na terenie fermy umyj i zdezynfekuj miejsca kontaktowe - rampa, pojemniki i miejsca do składowania padliny.**

**6. Stosuj poprawnie preparaty przeciwko owadom na zewnątrz obiektów jak i w środku. Stosuj środki przeciwko postaciom dorosłym oraz przeciwko larwom (bytującym w kale lub gnojowicy).**



**PAMIĘTAJ, ŻE ZAPYLENIE WEWNĄTRZ FERMY I KURZ OSIADAJĄCY NA POWIERZCHNIACI OGRANICZA DZIAŁANIE WIELU PREPARATÓW!**

Minione lata pokazują, że największa liczba zakażeń świń przypadała na okresy letnie. Jeśli nie wpuścimy wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń do naszych stad w najbliższych 3 miesiącach, wygramy.

**Największym zagrożeniem dla Twojej fermy jest dzik, człowiek i mucha.**

**HODOWCO! NIE DAJ SIĘ POKONAĆ WIRUSOWI ASF!  
BĄDŹ SPRYTNIJSZY!**